

Զ/հ	Անվանումը	Զ/մ	Քանակը		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆին. միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆին. միջոցներով	ընդհանուր	
1	ՊՇՌ ռեագենտների հավաքածու Ebola/Zaire վիրուսի հայտնաբերման համար	հավաքածու	1	1	650 000	650 000	Ռեագենտների ամբողջական հավաքածու Էբոլա/Զաիր վիրուսի հայտնաբերման համար հետադարձ տրանսկրիպցիայի և ամպլիֆիկացիայի միջոցով, RT /իրական ժամանակում/ տարբերակով:
2	ՊՇՌ հավաքածու լեյշմանիոզի ախտ. համար	հավաքածու	1	1	420 000	420 000	ՊՇՌ - FRT 50 F ռեագենտների հավաքածու կլինիկական նյութում հիբրիդիզացիոն- ֆլուորեսցենտ դետեկցիայով ՊՇՌ մեթոդով Leishmania-ի ԴՆԹ հայտնաբերելու համար: 50 հետզոտության համար:
3	Corinebacterium diphteriae-ի ԴՆԹ-ն կլինիկական նմուշից հայտնաբերման հավաքածու	հավաքածու	1	1	420 000	420 000	ՊՇՌ հավաքածու Corinebacterium diphteriae-ի ԴՆԹ- ն կլինիկական նմուշից հիբրիդիզացիոն- ֆլուորեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար “իրական ժամանակի” ռեժիմում:
4	Տուլարեմիայի հարուցիչի հայտնաբերման հավաքածու	հավաքածու	1	1	420 000	420 000	Ռեագենտների հավաքածու՝ կենսաբանական նյութում (օրինակ՝ արյուն, պունկատնոտ բուրոնից) Francisella tularensis –ի ԴՆԹ-ի հիբրիդիզացիոն- ֆլուորեսցենցիայի դետեկցիայով ՊՇՌ մեթոդով հայտնաբերման համար, նախատեսված „իրական ժամանակի ռեժիմով“:
5	Կատաղության վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	հավաքածու	1	1	420 000	420 000	Ռեագենտների հավաքածու՝ արյան, թքի կամ աուտոպսիկ նյութի մեջ ՌՆԹ-ի վիրիոնի ՊՇՌ մեթոդով հայտնաբերման համար, նախատեսված „իրական ժամանակի ռեժիմով“:
6	Էլիինակոկոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ	հավաքածու	2	2	210 000	210 000	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար 8x12:

7	Լյամբլիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ 1	հավաքածու	1	1	210 000	210 000	Ռեագենտների հավաքածու կղանքում հակաձնի հայտնաբերման համար 8x12:
8	Ցիտոիցերկոզի ախտորոշման թեստ համակարգ	հավաքածու	1	1	210 000	210 000	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար 8x12:
9	Կրիպտոսպորիդիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ	հավաքածու	1	1	210 000	210 000	Ռեագենտների հավաքածու կղանքում հակաձնի հայտնաբերման համար 8x12:
10	Ստաֆիլակոկային A, B, C, D, E տիպերի էնտերոտոքսինների որոշման ԻՖԱ հավաքածու սննդամթերքում	հավաքածու	1	1	210 000	210 000	ԻՖԱ հավաքածու, նախատեսված սննդամթերքում ստաֆիլակոկային A, B, C, D, E տիպերի էնտերոտոքսինների որոշման համար:
11	Կու-ռիկկեցիոզների ախտորոշման ԻՖԱ հավաքածու	հավաքածու	1	1	210 000	210 000	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Ֆորմատ:
12	SS ազար	կգ	35	35	86 000	86 000	Փոշենման զանգված-շիզելաների և սալմոնելաների ախտորոշիչ – սելեկտիվ սնուցող միջավայր:
13	Վիամուտ-սուլֆիտ ազար	կգ	10	10	60 000	60 000	Նախատեսված է սալմոնելաների ջրից, սննդամթերքից, կլինիկական տարբեր նյութերից սելեկտիվ անջատման և նախնական տարբերակման համար:
14	Եռաքարային միջավայր ըստ Օլկենիցկու (կամ երկաթ-սուլֆիտային միջավայր միզանյութով)	կգ	25	25	66 700	66 700	Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների կուտակման և նույնականացման համար:
15	Կոդի միջավայր կամ SDS արգանակ	կգ	15	15	178 000	178 000	Սննդային միջավայր էնտերոբակտերիաների անջատման ու տարբերակման համար:
16	Սելենիտային կամ Լեյֆտնի արգանակ (մաս Ա և մաս Բ)	կգ	20	20	89 000	89 000	Սալմոնելաների հարստացման միջավայր՝ կղանքից, մեզից, և այլ ախտաբանական նյութերից անջատելու համար:
17	Հավելում Հոյլի միջավայրի կամ կորկնեբակտերագարի համար՝ Կալիումի տելուրիտի 3,5%-անոց լ-թ	սրվ.	10	10	18 000	18 000	Բաղադրությունը՝ կալիումի տելուրիտի 3,5 % լուծույթ, յուրաքանչյուր սրվակում 10 մլ: Ծախսը՝ 1000մլ պատրաստի միջավայրին 10 մլ 3,5 % լուծույթ (մեկ սրվակ):

18	Քիմիական մաքուր գլյուկոզ	կգ	10	10	2 300	2 300	Չոր սպիտակ փոշենման զանգված, օգտագործվում է սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար:
19	Քիմիական մաքուր լակտոզ	կգ	15	15	2 300	2 300	Չոր սպիտակ փոշենման զանգված, օգտագործվում է սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար:
20	ՄԻԲ-երի հավաքածու N2	տուփ	16	16	43 700	43 700	Հավաքածու N2 Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների միջցեղային և տեսակային տարբերակման համար,
21	Ճագարի չոր պլազմա	սրվ.	60	60	5 500	5 500	Նախատեսված է պլազմակոագուլյացիայի ռեակցիայում ստաֆիլակոկերի ներտեսակային նույնականացման համար:
22	Զիու շիճուկ նորմալ	սրվ.	35	35	12 650	12 650	Նախատեսված է որոշ մանրէների աճեցման համար մանրէաբանական միջավայրերի վրա որպես հավելում ավելացնելու համար:
23	Մակ-Կոնկե արգանակ չեզոք կարմիրով կամ Violet Red Bile Broth	կգ	4	4	110 000	110 000	ՄակԿոնկե արգանակ չեզոք կարմիրով. ծախսը կազմում է 40.0գ փոշի 1000մլ միջավայրին:
24	Թիոգլիկոլային միջավայր	կգ	4	4	75 000	75 000	Հոմոգեն դեղնավուն փոշի է, նախատեսված է մանրէազերծման որակը ստուգելու , ինչպես նաև աէրոբ և անաէրոբ մանրէների աճեցման համար:
25	Մսա-պեպտոնային կամ չոր սնուցող ազար	կգ	10	10	69 500	69 500	Փոշենման զանգված-ընդհանուր ցուցման սնուցող միջավայր:
26	Սիմոնսի միջավայր	կգ	1.5	1.5	92 500	92 500	Հոմոգեն դեղնավուն փոշի է, կիրառվում է որպես էնտերոբակտերիաների տարբերակման միջավայր:
27	Ացետատային ազար	կգ	1.5	1.5	71 300	71 300	Հոմոգեն կանաչա -դեղնավուն փոշի է, կիրառվում է որպես էնտերոբակտերիաների տարբերակման միջավայր:
28	Մաննիտ-աղային ազար կամ Ժելատին-մաննիտ-աղային ազար	կգ	16	16	43 500	43 500	Ստաֆիլակոկերի աճեցման հատուկ միջավայր:
29	Բորդետելազար կամ Բորդե-ժանգուի միջավայր	կգ	0.5	0.5	65 000	65 000	Նախատեսված է բորդետելաների անջատման համար:
30	Մսա-պեպտոնային արգանակ	կգ	2	2	39 000	39 000	Փոշենման զանգված-ընդհանուր ցուցման սնուցող միջավայր :

31	Լակտոբակտեր ազար կամ MRS միջավայր	կգ	3	3	64 000	64 000	Օգտագործվում է լակտոբակտերիաների անջատման համար: Հոմոգեն դեղնավուն փոշի է:
32	Բիֆիդոմբակտեր ազար	կգ	2	2	55 200	55 200	Ազարը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների բազմաթիվ տեսակների կուլտիվացման և պահպանման համար:
33	Սաբուրո ազար	կգ	8	8	32 000	32 000	Հոմոգեն բաց-դեղնավուն փոշի է, նախատեսված խմորասնկերի և բորբոսասնկերի ընտրողական աճեցման համար:
34	Էնտերակոկազար	կգ	2	2	75 900	75 900	4 Էնտերոկոկ ազար Նախատեսված է էնտերոկոկերի անջատման համար:
35	Հիսի միջավայր լակտոգոլ	կգ	3	3	46 000	46 000	Հոմոգեն, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էնտերոբակտերիաների կողմից լակտոզան ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (գունավոր շարք):
36	Հիսի միջավայր գլյուկոգոլ	կգ	4	4	46 000	46 000	Հոմոգեն, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էնտերոբակտերիաների կողմից գլյուկոզան ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (գունավոր շարք):
37	Հիսի միջավայր մաննիտոլ	կգ	2	2	46 000	46 000	Հոմոգեն, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էնտերոբակտերիաների կողմից մաննիտը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (գունավոր շարք):
38	Մագնեզիումային միջավայր կամ սալմոնելաների հարստացման արզանակ՝ Ռապպոպորտ-Վասիլիադիսի միջավայր	կգ	8	8	35 500	35 500	Միջավայրը նախատեսված է սննդամթերքից և արտաքին միջավայրի այլ օբյեկտներից սալմոնելաների հարստացման և սելեկտիվ անջատման համար:
39	Պլոսկիրևի միջավայր	կգ	22	22	44 850	44 850	Սելեկտիվ միջավայր շիգելաների և սալմոնելաների անջատման համար: Պատրաստի միջավայրը թափանցիկ է, ունի դեղնա-վարդագույն գույն:
40	Կորինոբակտերիաների կողմից ցիստինի քայքայման թեստը որոշելու միջավայր	կգ	0.5	0.5	120 000	120 000	Տինսդայլի ազարի հիմքը փոշենման բաց դեղնավուն զանգված է կորինոբակտերիաների սելեկտիվ անջատման և տարբերակման համար:

	Հավելում կորինտրակտերիաների կողմից ցիստինի քայքայման թեստը որոշելու միջավայրի համար	սրվակ	-	-	-	-	Նախատեսված է դիֆթերիայի հարուցիչների սելեկտիվ անջատման և նախնական տարբերակման համար:
41	Խոշոր եղջերավոր անասունի չոր լեղի	կգ	0.1	0.1	207 000	207 000	Կիրառվում է էնտերոբակտերիաների անջատման ժամանակ գրամբացասական մանրէների աճի ճնշման համար:
42	Արյունային ազարի հիմք	կգ	2	2	50 000	50 000	Հոմոգեն դեղնավուն փոշի է, որից պատրաստված միջավայրը արյուն ավելացնելուց հետո օգտագործվում է ստրեպտոկոկերի, նեյսերիաների և այլ պահանջկոտ մանրէների աճեցման համար:
43	Մյուլլեր-Հինտոնի միջավայր	կգ	2.5	2.5	76 500	76 500	Նախատեսված է մանրէների հակամանրէային զգայնության որոշման համար: Հոմոգեն բաց դեղնավուն փոշենման զանգված է:
44	Բուֆերային լուծույթ	տուփ	3	3	17 250	17 250	Նախատեսված է միջավայրի թթվա-հիմնային հավասարակշռության պահպանման համար: Ֆոսֆատ-աղային բուֆերային լուծույթ է, pH= 5,5±0,2 ցուցանիշով:
45	Գրամով ներկման ներկերի հավաքածու	հավաքածու	20	20	25 000	25 000	Միկրոօրգանիզմների ըստ Գրամի տաբերակիչ ներկման համար ներկանյութերի հավաքածու:
46	Տրանսպորտային միջավայր Կերի Բլեր՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում	հատ	300	300	460	460	Նախատեսված է կլինիկական նյութի՝ կղանքի նմուշառման , տեղափոխման և պահպանման համար:
47	Տրանսպորտային միջավայր մենինգակոկերի համար Ստյուարտի միջավայրով՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում	հատ	100	100	403	403	Նախատեսված է պահանջկոտ մանրէներ, մասնավորապես Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման ,տեղափոխման և պահպանման համար:
48	Տրանսպորտային միջավայր Ամիես կլինիկական նյութերի համար՝ ակտիվացված ածուխով՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում	հատ	50	50	575	575	Նախատեսված է պահանջկոտ օդակյաց և անօդակյաց մանրէներ պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման , տեղափոխման և պահպանման համար:
49	Մաքուր բույր	կգ	3	3	43 000	43 000	Արզանակը նախատեսված է խմորասնկերի և բորբոսասնկերի աճեցման համար, ինչպես նաև բժշկական նշանակության գործիքների և իմունոլոգիական պատրաստուկների մանրէազերծման որակի հսկողության համար:

50	Բրոմ-թիմոլո կապույտ ինդիկատոր	գր	1500	1500	288	288	Մանր բյուրեղային մուգ դարչնագույն փոշի է,քիմիական ֆորմուլան՝ C27H31O5NSBr2 : Օգտագործվում է որպես ինդիկատոր և միջավայրի pH փոփոխությունից կախված գույնը փոխվում է դեղինից կապույտ:
51	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար I-VI, sonnei	սրվ.	40	40	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների I-VI, S.sonnei նկատմամբ:
52	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների I-V	սրվ.	40	40	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների I-V նկատմամբ;
53	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների I-ին տիպ	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների տիպ I նկատմամբ;
54	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների II տիպ	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների տիպ II նկատմամբ;
55	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների III տիպ	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների տիպ III նկատմամբ;
56	Չոր շիզելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների VI տիպ	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիզելա ֆլեքսների տիպ VI նկատմամբ;

57	Չոր շիգելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար S, sonnei	սրվ.	20	20	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիգելա զոնների նկատմամբ; Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 4 -10°C
58	Չոր շիգելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների խմբ. 3,4	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիգելա ֆլեքսների խմբ. 3,4 նկատմամբ
59	Չոր շիգելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների խմբ. 6	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիգելա ֆլեքսների խմբ. 6 նկատմամբ
60	Չոր շիգելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար ֆլեքսների խմբ. 7,8	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան հիպերիմունիզացված, լիոֆիլիզացված շիճուկ; Հոմոգեն, փոշենման զանգված է, պարունակում է հակամարմիններ շիգելա ֆլեքսների խմբ. 7,8 նկատմամբ
61	Չոր սալմոնելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար ABCDE	սրվ.	40	40	16 100	16 100	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում ABCDE խմբերի անտիգենների նկատմամբ;
62	Չոր սալմոնելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար O4	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է O 4 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;
63	Չոր սալմոնելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար O9	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է O 9 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;
64	Չոր սալմոնելոզային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար O12	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է O 12 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;

65	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար O7	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է O7 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;
66	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար Hi	սրվ.	20	20	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է H I անտիգենի նկատմամբ;
67	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար H gm	սրվ.	15	15	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է Hgm խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ
68	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար H 1,7	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է H 1,7 խմբի անտիգենի նկատմամբ;
69	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար H 1,2	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է H1,2 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;
70	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար H1,5	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է H1,5 խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ
71	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար H1,6	սրվ.	5	5	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է H 1,6 անտիգենի նկատմամբ
72	Չոր սալմոնեղգային ադսորբցված ախտորոշիչ շիճուկ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի հազվագյուտ խումբ պոլիվալենտ	սրվ.	10	10	13 800	13 800	Ճագարի կամ ոչխարի արյան իմունիզացված ադսորբցված շիճուկ, լիոֆիլիզացված: Պարունակում է O –պոլիվալենտ հազվագյուտ խմբի անտիգենային կոմպլեքսի նկատմամբ;
73	Էշերիխիոզ ախտորոշիչ շիճուկ O26	սրվ.	10	10	18 400	18 400	Իրենից ներկայացնում է ախտորոշիչ էշերիխիոզին խմբային և ֆակտորային O ադսորբցված չոր լիոֆիլիզացված շիճուկ, որը լցված է սրվակների մեջ՝ 1մլ չոր լիոֆիլիզատի ձևով:

74	Էշերիխիոզ ախտորոշիչ շիճուկ Օ55	սրվ.	10	10	18 400	18 400	Իրենից ներկայացնում է ախտորոշիչ էշերիխիոզին խմբային և ֆակտորային Օ ադսորբցված չոր լիոֆիլիզացված շիճուկ, որը լցված է սրվակների մեջ՝ 1մլ չոր լիոֆիլիզատի ձևով:
75	Էշերիխիոզ ախտորոշիչ շիճուկ Օ111	սրվ.	10	10	18 400	18 400	Իրենից ներկայացնում է ախտորոշիչ էշերիխիոզին խմբային և ֆակտորային Օ ադսորբցված չոր լիոֆիլիզացված շիճուկ, որը լցված է սրվակների մեջ՝ 1մլ չոր լիոֆիլիզատի ձևով:
76	Էշերիխիոզ ախտորոշիչ շիճուկ Օ157	սրվ.	10	10	18 400	18 400	Իրենից ներկայացնում է ախտորոշիչ էշերիխիոզին խմբային և ֆակտորային Օ ադսորբցված չոր լիոֆիլիզացված շիճուկ, որը լցված է սրվակների մեջ՝ 1մլ չոր լիոֆիլիզատի ձևով:
77	Պոտորության օպտիկական ստանդարտ՝ Ըստ Մակ-Ֆարլանդի (0,5 և 1,0) կամ ըստ Տարասևիչի (5 և 10)	հավաք	2	2	7 000	7 000	Պոտորության օպտիկական ստանդարտը նախատեսված է տեսողական մեթոդով բակտերիալ կախուկի պոտորության որոշման համար:
78	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆոտաքսիմի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Ցեֆոտաքսիմի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
79	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆալեքսիմի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Ցեֆալեքսիմի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
80	Հակամանրէային սկավառակներ բենզիլպենիցիլինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Բենզիլպենիցիլինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
81	Հակամանրէային սկավառակներ աուգմենտինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Աուգմենտինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
82	Հակամանրէային սկավառակներ ամիկացիինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Ամիկացիինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:

83	Հակամանրեային սկավառակներ ազիտրոմիցինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Ազիտրոմիցինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
84	Հակամանրեային սկավառակներ նալիդիքսաթթվի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Նալիդիքսաթթվի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
85	Հակամանրեային սկավառակներ ցիպրոֆլոքսացինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Ցիպրոֆլոքսացինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
86	Հակամանրեային սկավառակներ նիտրոֆուրանտոինի	սրվ.	5	5	2 875	2 875	Նիտրոֆուրանտոինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
87	Հակամանրեային սկավառակներ կօտրիմոքսազոլի	սրվ.	3	3	2 875	2 875	Կօտրիմոքսազոլի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
88	Հակամանրեային սկավառակներ նիստատինի	սրվ.	3	3	2 875	2 875	Նիստատինի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
89	Հակամանրեային սկավառակներ ֆլյուկոնազոլի	սրվ.	3	3	2 875	2 875	Ֆլյուկոնազոլի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ:
90	Ախտահանիչ նյութ	հաբ	60000	60000	70	70	Ախտահանիչ հաբեր - 1 հաբում դիքլորիզոցիանուրանական թթվի աղը 84%, 1 հաբում ակտիվ քլորի բաղադրությունը ոչ պակաս 45%-ից:

91	Պրեսեպտ կամ համաքժեք	տուփ	52	52	9 700	9 700	Ազդող նյութ է հանդիսանում դիքլորիդոցիանաթթվի նատրումական աղը, որը կազմում է հաբի քանակության 50%-ը: Հաբը կշռում է 5գրամ, որի մեջ ազդող նյութի քանակը 2,5 գրամ է, 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվում է 1,76գ ակտիվ քլոր:
92	Նատրիումի քլորիդ	կգ	30	30	1 150	1 150	Քիմիական միացություն է ,նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի աշխատանքների համար:
93	Էքսիկատոր՝ անաէրոստատ 2,5լ տարողությամբ	հատ	2	2	9 200	9 200	Հաստ ապակուց պատրաստված անոթ, 2,5լ տարողությամբ, որի կափարիչը ունի հերմետիկ փակվելու հատկության :
94	Թաղանթներ <Վլադիպոր> N4՝ 35 մմ տրամագծով (250 հատ/տուփ)	տուփ	12	12	107 500	107 500	Միկրոծակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են,պատրաստված ացետատային ցելյուլոզայի հիմքի վրա :
95	Թաղանթներ <Վլադիպոր> N4՝47 մմ տրամագծով (250 հատ/տուփ)	տուփ	3	3	107 500	107 500	Միկրոծակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են,պատրաստված ացետատային ցելյուլոզայի հիմքի վրա :
96	Սկավառակներ օքսիդազայով (սրվ./50 հատ)	սրվ.	30	30	13 000	13 000	Սկավառակներ օքսիդազայով, օգտագործվում են մանրէների տարբերակման համար: 1 սրվակը պարունակում է 50 սկավառակ:
97	Միանվագ օգտագործման պլաստիկ տարաներ՝ հեղուկ նմուշների համար (50-100մլ տարողությամբ)	հատ	400	400	5 000	5 000	Կիրառվում է հեղուկ նմուշների նմուշառման, պահպանման և տեղափոխման համար:
98	Մանրէազերծ տարաներ՝ նվազագույնը 500 մլ տարողությամբ հատ	հատ	100	100	5 000	5 000	Կիրառվում է հեղուկ նմուշների նմուշառման, պահպանման և տեղափոխման համար:
99	Ապակյա շշեր՝ 250 մլ տարողությամբ	հատ	600	600	3 250	3 250	Մինչև 250 մլ տարողությամբ և 10մլ-ական սանդղակային նշումներով ապակյա շշեր, ավտոկլավացման ենթակա:
100	Ապակյա շշեր՝ 500 մլ տարողությամբ	հատ	200	200	3 750	3 750	Մինչև 500 մլ տարողությամբ և 10մլ-ական սանդղակային նշումներով ապակյա շշեր, ավտոկլավացման ենթակա:
101	Փորձանոթ՝ ապակյա, 15 մմ տրամագծով, երկարությունը 14-15սմ	հատ	3000	3000	154	154	Նախատեսված է մանրէաբանական հետազոտությունների համար: Ապակյա, 15 մմ տրամագծով և 14-15սմ երկարությամբ:

102	Միանվագ օգտագործման մանրէագերծ փորձանոթներ վիրախծուծով	հատ	2000	2000	325	325	Նախատեսված է կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար:
103	Միանվագ օգտագործման ձողեր՝ վիրախծուծ, անհատական փաթեթավորմամբ	հատ	5000	5000	150	150	Միանվագ օգտագործման պլաստիկ ձող բամբակյա վիրախծուծով՝ կլինիկական և սանիտարական քսուկի նմուշառման համար:
104	Պետրիի թաս՝ միանվագ օգտագործման	հատ	3000	3000	140	140	9-10սմ տրամագծով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:
105	Թանգիլ	մետր	500	500	1 000	1 000	Թանգիֆ բժշկական բամբակե սպիտակ՝ թեթև, հիգրոսկոպիկ, բամբակե գործվածք է հասարակ հյուսվածքային՝ հատուկ բժշկական նպատակների համար:
106	Սպիրտայրոց	հատ	15	15	5 000	5 000	Լաբորատոր աշխատանքների համար: Ապակյա անոթ է, պատրույգով և կափարիչով: Այրման գործընթացը իրականացվում է 96% էթիլ սպիրտի միջոցով:
107	Խալաթ՝ միանվագ օգտագործման	հատ	150	150	2 000	2 000	Պատրաստված ոչ կտրային պոլիպրոպիլենից (սպանբոնդ), չի սահմանափակում շարժումները, կարող է օգտագործվել ինչպես բժշկական, այնպես էլ հանրային սննդի կազմակերպություններում:
108	Մանրէաբանական օղ՝ 2մմ տրամագծով(տուփ/10հատ)	տուփ	20	20	1 000	1 000	Մանրէաբանական գործիքի՝ օղի բաղկացուցիչ մասն է: Մետաղական 50մմ երկարությամբ լար, որի ծայրը 2 մմ տրամագծով օղ է:
109	Մանրէաբանական օղ՝ 3մմ տրամագծով(տուփ/10հատ)	տուփ	20	20	1 000	1 000	Մանրէաբանական գործիքի՝ օղի բաղկացուցիչ մասն է: Մետաղական 50մմ երկարությամբ լար, որի ծայրը 3 մմ տրամագծով օղ է:
110	Մանրէաբանական օղ՝ 4մմ տրամագծով(տուփ/10հատ)	տուփ	10	10	1 000	1 000	Մանրէաբանական գործիքի՝ օղի բաղկացուցիչ մասն է: Մետաղական 50մմ երկարությամբ լար, որի ծայրը 4մմ տրամագծով օղ է:
111	Ամրակալներ՝ մանրէաբանական օղերի համար	հատ	30	30	500	500	Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայի աշխատանքների համար: Պատրաստված է նիկելից, պատված պոլիքլորվինիլային ծածկույթով:

112	Կաթոցիկներ՝ ապակյա՝ 1մլ-անոց	հատ	1000	1000	170	170	Կիրառվում է լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում 1-մլ ծավալով չափումներ կատարելու համար:
113	Կաթոցիկներ՝ ապակյա՝ 5մլ-անոց	հատ	500	500	400	400	Կիրառվում է լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում 5-մլ ծավալով չափումներ կատարելու համար:
114	Բիքս՝ մետաղական՝ տրամագիծը՝ 30սմ	հատ	8	8	15 000	15 000	Զժանգոտվող պողպատից պատրաստված գլանաձև տարաներ, բացվող կափարիչով և անցքերով:
115	ՔԻ-ի որոշման ինդիկատորային թղթիկներ՝ ունիվերսալ, որոշման նվազագույնը 3-10 սահմանով	տուփ	20	20	100	100	Լաբորատոր աշխատանքներում քի-ի որոշման համար, ինդիկատորային թղթե շերտեր են, ունիվերսալ:
116	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 110°20C /30րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար(տուփ/500հատ)	տուփ	1	1	20 000	20 000	Միանգամյա կաշուն շերտով և հակառակ կողմում մանրէազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով:
117	Զեռնոց բժշկական առանց փոշու	տուփ	10	10	5 000	5 000	Լատեքսային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, անատոմիական: Փաթեթավորումը տուփով, տուփի մեջ 100 հատ:
118	Զեռնոց բժշկական փոշով	տուփ	10	10	4 000	4 000	Լատեքսային, մանրէազերծ, վիրաբուժական, փոշիով, անատոմիական: Փաթեթավորումը տուփով, տուփի մեջ 100 հատ:
119	Զեռնոց բժշկական մանրէազերծ	գույգ	1100	1100	150	150	Լատեքսային, մանրէազերծ, վիրաբուժական, անատոմիական: Փաթեթավորումը տուփով, տուփի մեջ 1 գույգ:
120	Բինտ 1	հատ	1000	1000	1 000	1 000	Բամբակյա 15 սմ լայնությամբ, ոչ ստերիլ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:
121	Բինտ 2	հատ	700	700	1 000	1 000	Բամբակյա 15 սմ լայնությամբ, ստերիլ : Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:

122	Բամբակ	հատ	300	300	650	650	Հիդրոֆիլ 100%-անոց բնական բամբակ, 100 գրամանոց փաթեթավորումով՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար՝ տնային, ամբուլատոր և հիվանդանոցային պայմաններում օգտագործելու համար: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:
123	Սպիրտ	լիտր	280	280	1 600	1 600	96 % բժշկական, անգույն հեղուկ, այրող համով, մանրէազերծ հատկությամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների , քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
124	Ձեռնոց 1	հատ	440	440	114	114	100% նիտրիլային PH չեզոք, դիմանում է -20-ից -130 °C, հաստությունը 0,12մմ, երկարությունը 250մմ-ից բարձր, որակի երաշխավորումը ISO 9000-2000 պահանջներին համապատասխան: Չափսը 7,5մմ - 8մմ: Փաթեթավորումը տուփերով:
125	Ձեռնոց 2	հատ	440	440	114	114	100% նիտրիլային PH չեզոք, դիմանում է -20-ից -130 °C, հաստությունը 0,12մմ, երկարությունը 250մմ-ից բարձր, որակի երաշխավորումը ISO 9000-2000 պահանջներին համապատասխան: Չափսը 8,5մմ - 9մմ: Փաթեթավորումը տուփերով:
126	Ձեռնոց 3	հատ	240	240	114	114	100% նիտրիլային PH չեզոք, դիմանում է -20-ից -130 °C, հաստությունը 0,12մմ, երկարությունը 250մմ-ից բարձր, որակի երաշխավորումը ISO 9000-2000 պահանջներին համապատասխան: Չափսը 9,5մմ-10մմ: Փաթեթավորումը տուփերով: